

Fjernelse af ”hudforandring” eller ”knude” under huden i lokalbedøvelse.

Operationen foretages i lokalbedøvelse, som bliver sprøjtet ind under huden. Under operationen vil du ofte kunne mærke berøring, men ingen smerte. Såret lukkes med en tråd, som skal fjernes efter 7-12 dage hos din egen læge eller her på klinikken. I nogle tilfælde lukkes såret med en tråd i underhuden, som ikke skal fjernes. Den opløses af sig selv. Ofte er der en løkke i enden af såret, som kan afklippes under knuden efter 2 uger.

Efter operationen:

Mod smerter: Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer.

Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerte tages almindelige håndkøbspræparater Pinex, Kodimagnyl, eller Ibuprofen.

Forbinding: Forbindingen fjernes efter 3 dage (med mindre andet er aftalt). Ved behov kan såret derefter dækkes med Micropore (papirplaster), som kan købes på apoteket.

Efter trådfjernelse anbefales det i 3 måneder at have Micropore på såret for at undgå, at kanterne skrider fra hinanden. Ved udsættelse for sollys tilrådes man ligeledes at såret dækkes med Micopore i op til 6 måneder efter operationen.

Restriktioner: Med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner i, hvad man må, dog frarådes badning i svømmehal og havvand, indtil trådene er fjernet.

Komplikationer:

I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger.

Meget sjældent kan der ved fjernelse af knuder under huden være risiko for nerveskade, som kan medføre nedsat følelse eller lammelse af muskler.

I yderst sjældne tilfælde kommer der betændelse.

I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller fortykkede.

Søg læge:

Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38,5°C) kontaktes klinikken, vagtlæge eller skadestue.

Rutinemæssigt bliver det fjernet vævsstykke sendt til undersøgelse. Efter aftale går svaret til dig pr brev, e-mail eller til din egen læge.