

# Operation for hæmorider og marisker.

**Hæmorider** er åreknuder i endetarmskanalen. De hyppigste årsager til hæmorider er obstipation (hård mave), efter graviditeter eller arvelige forhold. Symptomer: blødning, hævelse, tyngdefornemmelse, sekretion og hygiejneproblemer.

**Marisker** er udvendige hudlapper. Giver ingen smerter, men hygiejneproblemer.

## Behandling:

Hæmorider behandles i de lette tilfælde med elastik (se vejledning) til kirurgisk fjernelse i de svære tilfælde.

Marisker fjernes kirurgisk.

Ved forundersøgelsen udleveres Xylokain gel, som er lokalbedøvelse. Det smørres omkring endetarmsåbningen 1 time inden operationen. Det er for at mindske ubehaget, når der sprøjtes lokalbedøvelse under huden omkring endetarmsåbningen.

Operation foregår ved at man ligger på siden.

Ved operationen lades sårene stå åbne for at mindske risikoen for infektion.

## Efter operationen

Efter operationen får man smertestillende medicin i form af tablet Pinex 1 gram gange 4 og tablet Ibuprofen 400 mg gange 3 med hjem til de første dage. De første dage kan sårene væske og bløde lidt, man kan evt. anvende bind. Sårene plejes med håndbrusning 2 gange dagligt og efter afføring. Hvis man har tendens til hård mave, er det en god idé at tage Magnesia 2 stk om aftenen (medgives) i 2 dage efter operationen.

Der tilrådes at have en ledsager med.

Sårene heler op efter 4-6 uger. I varierende grad kan man have smerter og ubehag. Ved operation for marisker kan man vanligvis genoptage sit arbejde efter 1-2 dage. Efter hæmorideoperation efter 1-2 uger.

## Kontrol:

Efter behov tilbydes en kontrol efter 8 uger.

## Komplikationer:

Det er ikke ualmindeligt at bløde i lettere grad i op til en uge efter operationen. Man kan have en øget afføringstrang, som efterhånden vil aftage. Infektion er sjældent.

## Søg læge:

Skulle der efter operationen opstå blødning med klumper, uacceptable smerter eller feber og utilpashed skal du kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue.