

Operation for ”Forhudsforsnævring”, phimosis.

Hvis forhuden er forsnævret og ikke kan føres bagud og væk fra penishovedet kan operation være nødvendigt.

Ved operationen for forhudsforsnævring fjernes størstedelen af forhuden. I udvalgte tilfælde kan man nøjes med et ”klip” i forhuden.

Før operationen:

Der er ingen forberedelser før operationen.

Under operationen:

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via stik på for- og bagsiden af penisroden. Størstedelen af forhuden fjernes og huden sys med sting, som forsvinder af sig selv i løbet af 3-4 uger. Operationen varer ca. 30-40 minutter.

Efter operationen:

De første 2-3 dage efter operationen kan der forekomme smerter, som kan behandles med Paracetamol (Panodil®, Pamol®, Pinex®) eller/og Ibuprofen (Ipren®, Ibumetin®). Du får tilbudt medicinen inden hjemtransporten. Man bør holde sig i ro 2 døgn efter operationen.

Operationssåret holdes rent med rindende vand/håndbrusning en gang om dagen.

Hvis suturerne bliver ”hårde” kan man smørre med lidt vaseline eller fugtighedscreme.

Komplikationer:

Blødning og infektion forekommer sjældent.

Ved mistanke om komplikationer bør du kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestuen.