

Kikkertundersøgelse af endetarmskanalen (anoskopi) og behandling af indvendige hæmorider.

Undersøgelsen udføres med et plastikrør, som indføres ca. 5 cm, efter at endetarmsåbningen er smurt med glidecreme.

Undersøgelsen foretages for at afsløre hæmorider, polypper, sår og kræft.

Hæmorider er forstørrede blodårer dækket med slimhinde. Den indvendige øverste del af endetarmskanalen er følelsesløs.

Igennem røret kan man, hvis der er behov for det sætte elastikker på hæmorider.

På undersøgelsesdagen:

Ca. 2 timer inden undersøgelsen indføres klyismaet med tubespidsen i hele dens længde i endetarmskanalen. Spidsen kan evt. fugtes med vand eller vaseline. Hele indholdet presset ud og tuben fjernes fra endetarmskanalen, mens den er sammenpresset. Indholdet fra klyismaet forsøger man at holde tilbage i 10 minutter inden tarmen tømmes.

Undersøgelsen foregår enten i venstre sideleje eller på ryggen med benene i bøjler.

Ved behov for påsætning af elastikker på hæmorider, opsuges disse via et instrument. Det er ikke forbundet med smerter, men kan højst føles som en trækkende fornemmelse. Undersøgelsen og evt. behandling varer 1-5 minutter.

Efter undersøgelsen:

Du får med det samme svar på undersøgelsen. Ved elastikbehandling af hæmorider kan du det første døgn føle stramning og afføringstrang. Du tilbydes smertestillende medicin i form af Ibuprofen®.

Der er ingen forholdsregler efter operationen, og du kan gå normalt på toilettet. Man skal dog undgå at ”presse” for meget, da elastikkerne kan glide af.

Der tilrådes at have ledsager med evt. som fører af bil.

Efter 8-10 dage vil den afsnørede hæmoride falde af og forsvinde sammen med afføringen. Dette observeres normalt ikke, men kan en

sjældent gang medføre en smule blod i afføringen.

Ofte er der behov for 2-3 behandlinger med ca. 6 ugers interval.

Komplikationer:

Ekstremt sjældent kan der fra 2-10 dage efter behandlingen opstå kraftig blødning fra tarmen.

Ligeledes kan der ekstremt sjældent optræde kraftige smerter i tarmen ledsaget af feber.

Søg læge:

Ved kraftig blødning, smerter eller feber skal klinikken, vagtlæge eller skadestue kontaktes.