

Information om operation for hæmorider og marisker.

Hæmorider er åreknuder i endetarmskanalen. De hyppigste årsager til hæmorider er obstipation (hård afføring), efter graviditeter eller arvelige forhold.

Symptomer: blødning, hævelse, tyngdefornemmelse, sekretion og hygiejneproblemer.

Marisker er udvendige hudlapper. Giver ingen smerter, men hygiejneproblemer.

Behandling: Hæmorider behandles i de lette tilfælde med elastik (se vejledning) til kirurgisk fjernelse i de svære tilfælde.

Marisker fjernes kirurgisk.

Ved forundersøgelsen udleveres Xylocain gel, som er lokalbedøvelse. Det smørres omkring endetarmsåbningen 30 minutter inden operationen. Det er for at mindske ubehaget, når der sprøjtes lokalbedøvelse under huden omkring endetarmsåbningen.

Operation foregår ved at man ligger på venstre side. Ved operationen lades sårene stå åbne for at mindske risikoen for infektion. I udvalgte tilfælde lukkes såret med tråd, der opløses af sig selv.

Efter operationen får man smertestillende medicin Pamol® 1 gram gange 4 og tablet Ibumetin 400 mg gange 3 med hjem til de første par dage. Ved behov medgives tablet Magnesia 2 stk om aftenen for at undgå hård afføring.

Sårene heler op efter 4-6 uger. I varierende grad kan man have smerter og ubehag. Ved operation for marisker kan man vanligvis genoptage sit arbejde efter 1-2 dage.

Kontrol: Efter behov tilbydes en kontrol efter 8 uger.

Komplikationer: Det er ikke ualmindeligt at bløde i lettere grad i op til en uge efter operationen. Man kan have en øget

afføringstrang, som efterhånden vil aftage. Infektion er sjældent.

Søg læge: Skulle der efter operationen opstå blødning med klumper, uacceptable smerter eller feber og utilpashed skal du kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue.