

Kikkertundersøgelse af spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen (gastroskopi).

Undersøgelsen udføres via munden med en lang bøjelig kikkert, hvor igennem der kan føres instrumenter til udtagning af vævsprøver. For at folde mavesækken ud blæses der luft i mavesækken. Undersøgelsen foretages for at afsløre, om der er forandringer såsom sår, betændelse, spiserørsbrok, forsnævringer eller kræft.

Før undersøgelsen:

Du skal faste i 6 timer, dvs. ingen fødeindtagelse. Du må gerne drikke tynd væske indtil 2 timer før undersøgelsen. Nødvendig medicin kan indtages med en mundfuld vand.

HVIS du får mavesårsmedicin, som indeholder en af følgende stoffer: Lansoprazol, Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol eller Rabeprazol, bedes du undlade at tage medicinen 1 uge før undersøgelsen. Det er for at kunne konstatere eventuelle mavesårsbakterier. Ved symptomer kan du i stedet tage håndkøbsmedicin mod mavesyre (syreneutraliserende flydende medicin som Galieve®, Gaviscon®, Balacid®, Acinil® eller Kuracid®). Hvis undersøgelsen er planlagt med kort varsel, eller du ikke kan undvære din mavesårsmedicin, kan undersøgelsen foretages alligevel.

Undersøgelsen:

Svælget bliver lokalbedøvet med spray. Undersøgelsen foregår i venstre sideleje. Kikkerten føres ind i munden og via synets vejledning ned i spiserøret. Der er tilstrækkelig plads til at trække vejret både gennem næse og mund. Undersøgelsen foregår i et tæt samarbejde mellem dig og lægen, således at du hele tiden kan acceptere undersøgelsen.

Undersøgelsen varer 3-5 minutter. De fleste patienter finder undersøgelsen let til moderat ubehagelig på grund af opkastningsreflekser. Enkelte patienter finder undersøgelsen mere ubehagelig og kan have behov for beroligende medicin, som gives igennem et plasticrør i en blodåre.

Efter undersøgelsen:

Du får med det samme svar på undersøgelsen. Hvis der er taget vævsprøver, vil du få skriftligt svar pr. e-mail ca. 2 uger efter undersøgelsen.

Du må først spise og drikke en time efter undersøgelsen på grund af risiko for at få indholdet i luftrøret.

Hvis du har fået beroligende medicin, må du ikke køre bil samme dag, og du skal sørge for hjemtransport (pårørende eller offentlige transportmidler).

Hvis du ikke har fået beroligende medicin, kan du tage på arbejde.

Komplikationer:

Ses stort set aldrig ved denne undersøgelse.